

Проявление симптома Кера при остром холецистите

@1)болезненность при пальпации в правом подреберье, резко усиливающаяся на вдохе

@2)смещение боли от мечевидного отростка в правую подвздошную область

@3)болезненность при надавливании над ключицей справа

@4)болезненность при надавливании над ключицей слева на вдох

+++1000*4*1***

Острый холецистит у лиц пожилого возраста

@1)протекает с сильно выраженным болевым синдромом

@2)характеризуется яркой клинической картиной

@3)сопровождается многократной рвотой

@4)имеет стертое течение

+++0001*4*1***

Проявление симптома Мюсси-Георгиевского (френикус-симптом) при остром холецистите

@1)усиление боли в правой подвздошной области при кашле

@2)боль при глубокой пальпации в правом подреберье

@3)болезненность при надавливании над ключицей справа между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

@4)усиление боли в правой подвздошной области при глубоком выдохе

+++0010*4*1***

Одним из ранних признаков деструктивного панкреатита является

@1)болезненность при поколачивании по левой реберной дуге

@2)боли в верхних отделах живота, брадикардия

@3)многократная рвота с кровью

@4)ранний парез кишечника при выраженной интоксикации

+++0001*4*1***

Симптом Орнтера-Грекова (боль при поколачивании по правой реберной дуге боковой поверхностью кисти) типичен для

@1)острого холецистита

@2)острого аппендицита

@3)острого панкреатита

@4)острой кишечной непроходимости

+++1000*4*1***

К осложнениям язвенной болезни относится

1) пенетрация

2) желчнокаменная болезнь

3) портальная гипертензия

4) почечная колика

+++1000*4*1***

Появление боли за грудиной после еды при принятии горизонтального положения на спине характерно для

@1)хронического панкреатита

@2)грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

@3)хронического гастрита

@4)хронического холецистита

+++0100*4*1***

Механическая желтуха развивается при

@1)хроническом гепатите

- @2)желчнокаменной болезни
- @3)хроническом панкреатите
- @4)язвенной болезни

+++0100*4*1***

Дегтеобразный стул характерен для

- @1)желудочно-кишечного кровотечения
- @2)рака прямой кишки
- @3)кровотечения в брюшную полость
- @4)перитонита

+++1000*4*1***

Для желчной колики характерно

- @1)боли ноющего характера в правой подвздошной области при общем удовлетворительном состоянии
- @2)боли в поясничной области и боковых отделах живота с иррадиацией в паховые области, половые органы
- @3)постоянная резкая боль в эпигастральной области, в подреберьях с иррадиацией в спину, правую и левую лопатки
- @4)боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку и плечо, за грудину

+++0001*4*1***

Для болей при остром панкреатите характерно

- @1)боли ноющего характера в правой подвздошной области при общем удовлетворительном состоянии
- @2)боли в поясничной области и боковых отделах живота с иррадиацией в паховые области, половые органы
- @3)постоянная резкая боль в эпигастральной области, в подреберьях с иррадиацией в спину, правую и левую лопатки
- @4)боли без четкой локализации и без иррадиации, усиленная перистальтика кишечника

+++0010*4*1***

Для острого холецистита характерен симптом

- @1)Мейо-Робсона
- @2)Обуховской больницы
- @3)Ровзинга
- @4)Ортнера

+++0001*4*1***

Для острого панкреатита характерен симптом

- @1)Мейо-Робсона
- @2)Обуховской больницы
- @3)Ровзинга
- @4)Ортнера

+++1000*4*1***

Основная жалоба пациента при перфорации органа ЖКТ

- @1) тошнота
- @2) головная боль
- @3) боль в животе
- @4) кашель

+++0010*4*1***

Пациента с острым холециститом госпитализируют в _____ отделение

- @1)инфекционное
- @2)терапевтическое
- @3)гастроэнтерологическое
- @4)хирургическое

+++0001*4*1***

Признаки кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

@1)кровохарканье

@2)алая кровь на каловых массах

@3)рвотные массы цвета кофейной гущи

@4)гематурия

+++0010*4*1***

Тактика фельдшера при желудочно-кишечном кровотечении

@1)проведение оральной регидратации

@2)экстренная госпитализация пациента

@3)введение спазмолитиков

@4)введение анальгетиков

+++0100*4*1***

Интенсивные некупируемые спазмолитиками боли опоясывающего характера, неукротимая рвота характерны для

@1)энтероколита

@2)острого панкреатита

@3)острого гастрита

@4)язвенной болезни желудка

+++0100*4*1***

Длина зонда, вводимая в желудок взрослого человека, измеряется расстоянием от

@1)резцов до мочки уха и от мочки уха до мечевидного отростка

@2)от ушной раковины до диафрагмы

@3)от лобной области до пупочного кольца

@4)височной области до пупочного кольца

+++1000*4*1***

Показание для экстренной госпитализации пациента с язвенной болезнью желудка

@1)перфорация

@2)малигнизация язвы

@3)стеноз привратника

@4)обострение средней степени тяжести

+++1000*4*1***