

При уремической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах

- 1) аммиак+
- 2) алкоголя
- 3) ацетона
- 4) тухлых яиц

Ведущим симптомом почечной колики является

- 1) резь при мочеиспускании
- 2) частое мочеиспускание
- 3) повышение температуры
- 4) внезапная, постоянная и схваткообразная боль со стороны мочевыделительной системы +

Для почечной колики характерно

- 1) боли ноющего характера в правой подвздошной области при общем удовлетворительном состоянии
- 2) боли в поясничной области и боковых отделах живота с иррадиацией в паховые области, половые органы +
- 3) постоянная резкая боль в эпигастральной области, в подреберьях с иррадиацией в спину, правую и левую лопатки
- 4) боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку и плечо, за грудину

Тактика при впервые возникшей почечной колике

- 1) введение спазмолитиков и анальгетиков, активное наблюдение
- 2) госпитализация в хирургическое отделение без введения медикаментов
- 3) введение спазмолитиков и госпитализация в урологическое отделение+
- 4) тепло на поясничную область, «актив» в поликлинику

Обструкция лоханочно-мочеточникового сегмента приводит к

- 1) иррадиации боли в мезогастральную область+
- 2) иррадиации боли в паховую область и наружную поверхность бедра
- 3) иррадиация в головку полового члена и может сопровождаться учащенным мочеиспусканием, болями в уретре, ложными позывами к дефекации
- 4) иррадиация боли в подвздошные боли с обеих сторон

Сумма баллов по шкале Глазго у пациента с хронической болезнью почек составляет 6, что соответствует

- 1) ясному сознанию
- 2) оглушению
- 3) сопору
- 4) коме+

Обструкция в нижней трети мочеточника

- 1) иррадиации боли в мезогастральную область
- 2) иррадиации боли в паховую область и наружную поверхность бедра
- 3) иррадиация в головку полового члена и может сопровождаться учащенным мочеиспусканием, болями в уретре, ложными позывами к дефекации+
- 4) иррадиация боли в подвздошные боли с обеих сторон

Часто встречающаяся ошибка терапии почечной колики

- 1) введение спазмолитиков на догоспитальном этапе
- 2) стимуляция диуреза при развитии анурии на фоне почечной колики+

- 3) отсутствие госпитализации при купировании приступа, удовлетворительном состоянии при ранее диагностированной мочекаменной болезни
- 4) тепловые процедуры

На догоспитальном этапе при острой задержке мочи показано

- 1) проведение катетеризации жестким катетером с предварительным введением в/м спазмолитиков+
- 2) проведение катетеризации мягким катетером с предварительным введением в/м спазмолитиков
- 3) стимуляция диуреза мочегонными при развитии анурии
- 4) введение обезболивающих препаратов

Показания для госпитализации при остром пиелонефрите

- 1) субфебрильная лихорадка
- 2) умеренный болевой синдром
- 3) беременность на любом сроке+
- 4) желание пациента

Ведущим симптомом почечной колики является:

- 1) ноющие боли в правом или левом подреберье
- 2) частое обильное мочеиспускание
- 3) субфебрильная лихорадка
- 4) приступообразные острые боли+

Для почечной колики характерно:

- 1) боли ноющего характера в правой подвздошной области при общем удовлетворительном состоянии
- 2) боли в поясничной области и боковых отделах живота с иррадиацией в паховые области, половые органы+
- 3) постоянная резкая боль в эпигастральной области, в подреберьях с иррадиацией в спину, правую и левую лопатки
- 4) боли без четкой локализации и без иррадиации, усиленная перистальтика кишечника

Показание для госпитализации при почечной колике

- 1) наличие эффекта от медикаментозной терапии на догоспитальном этапе
- 2) умеренная боль при установленном диагнозе мочекаменная болезнь
- 3) приступ почечной колики у пациента с единственной почкой+
- 4) желание родственников госпитализировать пациента

На догоспитальном этапе при острой задержке мочи катетеризация проводится

- 1) жестким катетером
- 2) полужесткие катетером
- 3) мягким катетером+
- 4) любым из перечисленных

Действия фельдшера, если на догоспитальном этапе при острой задержке мочи попытка катетеризации не увенчалась успехом

- 1) ввести вторую дозу спазмолитика и через 30 минут повторить попытку
- 2) повторить попытку жестким катетером
- 3) без повтора попыток катетеризации, госпитализация в специализированный стационар или отделение+
- 4) «актив» в поликлинику для вызова уролога

Поколачивание по пояснице — это симптом

- 1) Пастернацкого+
- 2) Ортнера
- 3) Образцова
- 4) Мюсси

Абсолютное показание к госпитализации

- 1) колика на фоне диагностированной мочекаменной болезни
- 2) анурия +
- 3) настойчивое желание родственников на госпитализации
- 4) алкогольное опьянение пациента

Кожные покровы при уремической коме

- 1) гиперемированы, ярко выражен гипергидроз
- 2) сосудистые звездочки на спине, задней поверхности бедер, расчесы, геморрагии
- 3) бледные с желтизной, сухие, иногда с высыпаниями кристаллов мочевины в виде «уремической пудры»+
- 4) бледные, множественные петехии

Комбинированный препарат со спазмолитическим и анальгетическим эффектом относится

- 1) метамизол
- 2) спазмалгон +
- 3) дротоверин
- 4) ибупрофен

Абсолютное показание к экстренной госпитализации при остром пиелонефрите

- 1) пожилой возраст при отсутствии сопутствующей патологии
- 2) сахарный диабет в стадии декомпенсации+
- 3) подозрение на острый пиелонефрит, состояние удовлетворительное
- 4) острый пиелонефрит, развившийся на фоне мочекаменной болезни, состояние удовлетворительное