

К симптомам острого приступа глаукомы относятся

- 1) боль в глазу и соответствующей половины головы+
- 2) помутнение роговицы
- 3) отек и гематома век
- 4) диплопия

Ожог глазного яблока первой степени характеризуется следующими признаками

- 1) глубокий некроз роговицы
- 2) гиперемия конъюнктивы+
- 3) сужение поля зрения
- 4) поверхностное помутнение роговицы

Признак, характерный для ожогов роговицы щелочами

- 1) тенденция к увеличению тяжести поражения+
- 2) резкое повышение давления внутриглазного давления
- 3) коагуляционный некроз
- 4) блефароспазм

При контузии орбиты характерным симптомом является

- 1) повышенное слезотечение
- 2) ощущение инородного тела в глазу
- 3) повышение температуры тела
- 4) нарушение подвижности и положения глазного яблока+

При ожоге щелочами промывание проточной водой необходимо проводить в течение

- 1) 3-5 минут
- 2) 5-7 минут
- 3) 7-10 минут
- 4) 10-20 минут+

К симптомам проникающей раны роговицы относятся

- 1) мелкая передняя камера вплоть до полного ее отсутствия
- 2) гипотония глазного яблока
- 3) выпадение радужки в роговичную рану
- 4) все вышеперечисленное верно+

Симптомы инородного тела роговицы

- 1) ограничение подвижности глазного яблока
- 2) пониженная чувствительность роговицы
- 3) отек и гематома век
- 4) слезотечение, блефароспазм+

Укажите симптом, характерные для острого приступа глаукомы

- 1) отсутствие реакции зрачка на свет
- 2) слезотечение, светобоязнь
- 3) чувство онемения верхних конечностей
- 4) тошнота, рвота+

Первая помощь, оказываемая фельдшером СП на догоспитальном этапе при проникающей ране глазного яблока

- 1) репозиция ущемленных в ране оболочек глаза
- 2) иссечение ущемленных оболочек и герметизация раны

- 3) наложение повязки на оба глаза и срочный перевод больного в специализированный глазной травматологический центр+
- 4) закапывание миотиков

Абсолютный признак проникающей раны глазного яблока

- 1) снижение остроты зрения
- 2) слезотечение
- 3) светобоязнь
- 4) наличие внутриглазного инородного тела+

Какой признак характерен для первичной отслойки сетчатки

- 1) тошнота, рвота
- 2) повышенное слезотечение
- 3) возникновение аномальных светоощущений по типу вспышек и искр+
- 4) боли в области глазного яблока

Признак, характерный для ожогов роговицы щелочами

- 1) глубокая некротизация тканей+
- 2) выпадение радужки
- 3) коагуляционный некроз
- 4) нарушение целостности стенок орбиты

При проникающем ранении глазного яблока транспортировать пациента необходимо

- 1) в положении Фаулера
- 2) сидя с запрокинутой головой
- 3) сидя с опущенной головой
- 4) строго в положении лежа+

Оказание неотложной помощи при отслойке сетчатки

- 1) скорейшая транспортировка больного в стационар+
- 2) введение обезболивающих
- 3) введение сосудосуживающих средств
- 4) введение гипотензивных средств

Острый приступ закрытоугольной глаукомы могут вызвать

- 1) применение мочегонных средств
- 2) длительная физическая нагрузка с наклоном головы+
- 3) применение миотиков
- 4) применение гипотензивных средств