

На что указывает замедленное скорости расправления кожной складки живота?

- 1) дегидратацию+
- 2) гипергидратацию
- 3) лимфостаз
- 4) асцит

Первая линия терапии при анафилаксии у детей:

- 1) эпинефрин в/м+
- 2) эпинефрин в/в
- 3) лоратадин в/м
- 4) лоратадин в/в

Методом выбора для регидратации при обезвоживании средней степени тяжести (некоторая степень обезвоживания по классификации ВОЗ) является:

- 1) В/в инфузия кристаллоидных растворов+
- 2) В/в инфузия коллоидных растворов
- 3) Регидратация через назогастральный зонд
- 4) Пероральная регидратация

Рациональная тактика фельдшера скорой медицинской помощи при возникновении судорог у ребенка:

- 1) незамедлительную госпитализацию без дополнительных лечебных мероприятий
- 2) введение противосудорожных препаратов, при купировании судорог- "актив" в поликлинику
- 3) введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной поддержки, вызов "на себя" специализированной бригады скорой медицинской помощи+
- 4) введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной поддержки, госпитализацию в стационар

Судороги у детей раннего возраста чаще наблюдаются при

- 1) кровоизлиянии в головной мозг
- 2) опухоли мозга
- 3) эпилепсии
- 4) лихорадке+

Стартовая терапия при лихорадке у детей

- 1) ацетилсалициловая кислота
- 2) парацетамол, ибупрофен+
- 3) хлоропирамин
- 4) метамизол натрия

Физические методы охлаждения при лихорадке у детей на догоспитальном этапе противопоказаны:

- 1) всегда
- 2) при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела
- 3) при признаках «бледной лихорадки»+
- 4) при сопутствующих заболеваниях сердца

При носовом кровотечении у ребенка холод накладывают на:

- 1) затылок на 2 часа
- 1) область лба на 3 часа
- 1) область висков на 30 минут

4)переносицу на 30 минут+

При появлении у ребенка болей в животе в первую очередь надо исключить:

- 1)острую хирургическую патологию+
- 2)хронические заболевания органов пищеварения
- 3)инфекционные заболевания
- 4)хронические заболевания органов мочевого выделения

Беспокойство ребенка перед и при мочеиспускании характерно при поражении:

- 1)нижних мочевыводящих путей+
- 2)верхних мочевыводящих путей
- 3) клубочков почек
- 4)канальцев почек

Появление у ребенка неукротимой рвоты и запаха ацетона изо рта может свидетельствовать о:

- 1)кетозе+
- 2)остром аппендиците
- 3)геморрагическом васкулите
- 4)кишечной непроходимости

Для регидратации при диабетической коме ребенку на догоспитальном этапе применим раствор:

- 1)10% глюкозы
- 2)4% натрия гидрокарбоната
- 3)0,9% натрия хлорида+
- 4)полиглюкина

Для проведения оральной регидратации у детей используют:

- 1)реамберин
- 2)реополиглюкон
- 3)регидрон+
- 4)40% раствор глюкозы

Тактика купирования анафилактического шока у ребенка включает введение:

- 1)эуфиллина, эфедрина
- 2)адреналина, преднизолона+
- 3)лазикса, сульфата магния
- 4)папаверина, дибазола

При остром бронхите у детей развивается недостаточность:

- 1)сердечнососудистая
- 2)печеночная+
- 3)дыхательная
- 4)почечная

Приступ обструктивного ларингита у детей развивается:

- 1)в течение недели
- 2)внезапно, чаще ночью+
- 3)в течение 2-3 дней
- 4)в течение суток

Во время проведения реанимационного пособия для предупреждения западения языка валик необходимо поместить ребенку под:

- 1)голову
- 2)шею
- 3)плечи+
- 4)поясницу

Во время проведения ИВЛ воздух новорожденному ребёнку вдыхают методом:

- 1)рот-рот
- 2)рот-нос
- 3)рот-рот и нос одновременно+
- 4)любой вариант

Непрямой массаж сердца ребенку до года проводят:

- 1)одной рукой
- 2)одним пальцем
- 3)двумя руками
- 4)двумя пальцами+

Непрямой массаж сердца ребенку после года проводят

- 1)одним пальцем
- 2)двумя пальцами
- 3)одной рукой +
- 4)двумя руками

Асфиксия – это:

- 1)заглатывания воздуха при нарушении техники вскармливания
- 2)остановка дыхания
- 3)нарушение или отсутствие самостоятельного дыхания при наличии сердцебиения и других признаков жизни+
- 4)недостаток кислорода в крови

Апноэ – это:

- 1)остановка сердца
- 2)общий цианоз
- 3)остановка дыхания+
- 4)приступ судорог

Выбухание большого родничка у ребенка – это признак:

- 1)асфиксии
- 2)понижения внутричерепного давления
- 3)повышения внутричерепного давления+
- 4)фенилкетонурии

При асфиксической стадии истинного крупа проводится:

- 1)интубация+
- 2)гемотрансфузия
- 3)гемосорбция
- 4)гемодиализ

Одышка при приступе бронхиальной астмы у детей:

- 1)экспираторная +
- 2)инспираторная
- 3)смешанная
- 4)патологическая

У ребенка лихорадка, одышка, кашель, локальное укорочение перкуторного звука характерны для:

- 1) острого бронхита
- 2) хронического бронхита
- 3) острой пневмонии+
- 4) бронхиальной астмы

Причина затруднения дыхания при остром рините у детей:

- 1) отек слизистой носа, гиперсекреция слизи+
- 2) отек слизистой носа, гиперсекреция мокроты
- 3) атрофия и сухость слизистой носа
- 4) атрофия слизистой носа, гиперсекреция мокроты

Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля, охриплости голоса и стридорозного дыхания характерно для развития:

- 1) острого бронхита
- 2) приступа бронхиальной астмы
- 3) острого стенозирующего ларинготрахеита+
- 4) острого тонзиллита

Вынужденное положение ребенка во время приступа бронхиальной астмы:

- 1) лежа на правом боку
- 2) лежа на животе
- 3) лежа с приподнятым головным концом кровати
- 4) сидя с фиксированным плечевым поясом+

При судорогах ребенка необходимо уложить на поверхность:

- 1) ровную
- 2) твердую
- 3) мягкую +
- 4) любую

Проявления, характерные для «розовой» или «красной» лихорадки у ребенка:

- 1) ребенок заторможен, сонлив
- 2) кожа умеренно гиперемирована, горячая, влажная+
- 3) поведение не изменено
- 4) кожа бледная с «мраморным» рисунком, конечности холодные