

Перечень неотложных состояний для собеседования (в форме решения задач на диагностику и оказание доврачебной помощи)

1. Острый коронарный синдром – нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, без подъема сегмента ST.
2. Острая левожелудочковая недостаточность – сердечная астма, отек легких.
3. Гипертонический криз (осложненный/неосложненный).
4. ТЭЛА.
5. Кардиогенный шок.
6. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс).
7. Острая дыхательная недостаточность.
8. Острый стенозирующий ларинготрахеит.
9. Приступ бронхиальной астмы.
10. Острый холецистит, острый панкреатит.
11. Острые осложнения язвенной болезни желудка и 12перстной кишки.
12. Острые аллергические состояния: генерализованная крапивница, ангионевротический отек.
13. Анафилактический шок.
14. Осложнения сахарного диабета: кетоацидоз, кетоацидотическая кома; гипогликемическое состояние, гипогликемическая кома.
15. Уремическая кома.
16. ОНМК.
17. Неотложные состояния в педиатрии: гипертермический синдром, фебрильные судороги, обезвоживание, обструктивный бронхит.
18. Вертеброгенный болевой синдром.
19. Эпилептический приступ, эпилептический статус.
20. Синдром «острого живота»: острый аппендицит, апоплексия яичника, внематочная беременность, острая кишечная непроходимость.
21. Острый пиелонефрит, гломерулонефрит.
22. Почечная колика.
23. Острая задержка мочи.
24. Осложнения беременности, родов, послеродового периода: преэклампсия и эклампсия; акушерские кровотечения.
25. Травмы – тупая травма живота, грудной клетки, переломы, вывихи конечностей, ЧМТ.
26. Ранения.
27. Кровотечения: наружные, внутренние.
28. Ожоги и обморожения. Гипотермический синдром. Гипертермический синдром.
29. Отравления (угарным газом, кислотами и щелочами, алкоголем, наркотическими веществами, ядовитыми грибами).
30. Суицидальное поведение.

Задача

Вызов бригады скорой помощи на дом.

Пациенту 35 лет проводится амбулаторное лечение на дому, назначена антибактериальная терапия - ампициллин внутримышечно. Инъекцию выполняла участковая медсестра.

Через несколько минут после в/м введения ампициллина пациент стал жаловаться на общую слабость, прилив крови к лицу (“как бы обдало жаром”), головную боль, нарушение зрения, чувство тяжести за грудиной.

Объективно: Состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, цианоз губ. Зрачки расширены. Отмечается обильная потливость. Тоны сердца глухие. Пульс нитевидный, неправильного ритма 120 уд./мин.

АД 70/40 мм рт. ст. ЧДД 28 в мин. Одышка экспираторного характера.

Произошло непроизвольное мочеиспускание.

1. Определите неотложное состояние. Сформулируйте предварительный диагноз. Обоснуйте ответ.
2. Укажите возможные осложнения возникшего состояния.
3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи пациенту.
4. По каким параметрам необходимо осуществлять контроль состояния пациента? Какие изменения основных параметров жизнедеятельности будут свидетельствовать об эффективности проведенных мероприятий?
5. Нуждается ли пациент в госпитализации, если да, укажите правила транспортировки.